



Dr.med. Dr.med.dent. H. Bettinger
Dr.med. Dr.med.dent. K.-U. Feller
Dr.med. Dr.med.dent. U. Otte
Hindenburgstrasse 2 96450 Coburg
Telefon: 09561-5966-0
www.implantate-coburg.de
www.kieferchirurgie-coburg.de

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bei Ihnen wurde heute ein kieferchirurgischer Eingriff durchgeführt.

Beachten Sie doch bitte folgende ärztliche

Hinweise

1. Beißen Sie eine 1/2 Stunde auf den eingelegten Tupfer und spucken Sie ihn dann aus. Am Tag des Eingriffes (Narkose) sollte der Patient nicht unbeaufsichtigt sein.
2. Essen Sie erst, wenn Sie wieder volles Gefühl an der betäubten Stelle haben. Sie können normale Kost zu sich nehmen. Schonen Sie lediglich beim Kauen die Wunde.
3. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen. Sie müssen nicht das Bett hüten. Kopf bitte nicht tief lagern! Das Führen eines Fahrzeuges kann ärztlicherseits am Tag des Eingriffes nicht verantwortet werden.
4. Trinken Sie heute und morgen keinen Alkohol, keinen Bohnenkaffee, rauchen Sie vor allen Dingen für 2 – 3 Tage nicht. Sprechen Sie so wenig wie möglich.
5. Sie werden vermutlich heute und morgen Wundschmerzen, eine Schwellung über dem operierten Gebiet und vielleicht eine Störung der Mundöffnung bekommen. Dies ist leider normal und keineswegs bedrohlich. Nach ca. 48 Stunden ist die Schwellung am stärksten und geht anschließend wieder zurück.
6. Kühlen Sie bitte ab sofort die Wange auf der operierten Seite mit Feuchtkalten Umschlägen oder einem Eisbeutel für 2 Tage so oft als möglich. Sie vermindern dadurch die Schwellung. Wenden Sie auf keinen Fall in den ersten zwei Tagen Wärme an.
7. Vergessen Sie bitte nicht die Einnahme der Medikamente. Immer wenn Schmerzen auftreten, nehmen Sie bitte die verordneten Schmerzmittel in besprochener Dosierung ein.
8. Sollte es wider Erwarten bluten, dann beißen Sie mit der Wunde für 1 bis 2 Stunden auf ein sauberes, zusammengerolltes Taschentuch. Suchen Sie uns wieder auf, wenn danach die Blutung nicht steht. Unbedingt sollten Sie bei einer Blutung Spülen unterlassen.