



Praxis für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie Plastische Operationen

- zertifiziert für zahnärztliche Implantologie -

Dr. med. Dr. med. dent. H. Bettinger
dr. med. dr. med. dent. K.-U. Feller
Dr. med. Dr. med. dent. U. Otte

MVZ Coburg GbR
Hindenburgstraße 2, 96450 Coburg
Tel: 09561 / 5966-0

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bei Ihnen wurde heute ein kieferchirurgischer Eingriff durchgeführt.
Beachten Sie bitte folgende ärztliche

HINWEISE

1. Beißen Sie eine 1/2 Stunde auf den eingelegten Tupfer und spucken Sie diesen dann aus. Am Tag des Eingriffes (Narkose) sollte der Patient nicht unbeaufsichtigt sein.
2. Essen Sie erst, wenn Sie wieder volles Gefühl an der betäubten Stelle haben. Sie können normale Kost zu sich nehmen. Schonen Sie lediglich beim Kauen die Wunde.
3. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen. Sie müssen nicht das Bett hüten. Kopf bitte nicht tief lagern! Das Führen eines Fahrzeuges kann ärztlicherseits am Tag des Eingriffes nicht verantwortet werden.
4. Trinken Sie heute und morgen keinen Alkohol, keinen Bohnenkaffee, rauchen Sie vor allen Dingen für 2-3 Tage nicht. Sprechen Sie so wenig wie möglich.
5. Sie werden vermutlich heute und morgen Wundschmerzen, eine Schwellung über dem operierten Gebiet und vielleicht eine Störung der Mundöffnung bekommen. Dies ist leider normal und keineswegs bedrohlich.
6. Kühlen Sie bitte ab sofort die Wange der operierten Seite mit feuchtkalten Umschlägen oder einem Eisbeutel für zwei Tage so oft als möglich. Sie vermindern dadurch die Schwellung. Wenden Sie auf keinen Fall in den ersten zwei Tagen Wärme an.
7. Vergessen Sie bitte nicht die Einnahme der Medikamente. Immer wenn Schmerzen auftreten, nehmen Sie bitte die verordneten Schmerzmittel in besprochener Dosierung ein.
8. Sollte es wider Erwarten bluten, dann beißen Sie für 1 bis 2 Stunden auf ein sauberes, zusammengerolltes Taschentuch. Suchen Sie uns wieder auf, wenn danach die Blutung nicht steht. Unbedingt sollten Sie bei einer Blutung Spülen unterlassen.
9. Tamponadenwechsel bei Weisheitszahnentfernung oder großer Zyste in ca. 3-4 Tagen, sollte sich versehentlich ein Verband/eine Tamponade lösen, reicht eine Terminvereinbarung am nächsten Werktag in der Praxis.
10. In Notfällen erreichen Sie den Behandler über die mitgeteilte Handynummer.